

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 18-6-69 943209

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs

N° 105 / 1° supplément

JUIN 1969/22

CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMP

INFORMATIONS -

Les précipitations éparses de ces derniers jours et la tendance orageuse qui intéresse actuellement nos régions rendent indispensables certains traitements anticryptogamiques.

ROUILLE DE L'ASPERGE : Les plantations d'asperges, surtout celles qui ne sont pas encore entrées en production, traversent une période critique qui conditionnera la virulence des futures attaques de Rouille. Par ailleurs, en cette époque de végétation active, certaines plantations traitées depuis le début du mois ne sont plus que partiellement protégées du fait de l'apparition ultérieure de nouveaux turions et de la croissance des autres. De plus, les précipitations survenues récemment risquent d'avoir lessivé les traitements déjà exécutés.

Aussi nous recommandons de renouveler le traitement Rouille avec un des fongicides recommandés dans les bulletins n° 103 d'avril et 104 de mai.

ALTERNARIA DE LA TOMATE : Sur les tomates destinées à la conserverie, les pluies survenues récemment risquent de déclencher une première manifestation d'Alternaria dans certains secteurs ou dans des cultures soumises à des conditions locales très particulières et favorables à l'évolution de la maladie.

Si pour l'instant aucune attaque d'alternaria n'a encore été observée il est prudent d'intervenir préventivement en exécutant un traitement avec un des produits suivants : Manèbe, Mancozèbe, Folcid, Propinèbe, etc... de préférence aux sels de cuivre qui, peu efficaces contre cette maladie, sont légèrement dépressifs.

Profiter de ce traitement pour ajouter à la bouillie un produit aphicide autorisé en cultures maraîchères et dont la liste a été publiée dans l'édition spéciale du Bulletin des Avertissements Agricoles du 12 janvier 1969.

TEIGNE DU POIREAU : Poursuivre les traitements contre ce parasite qui manifeste actuellement une certaine activité.

P. CHRESTIAN - J. LAVY

TORDEUSE ORIENTALE

A la liste des produits conseillés pour lutter contre la Tordeuse orientale il convient d'ajouter : Phosalone, omis dans notre bulletin n° 105.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Ministère de l'Agriculture
STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS VITICOLES

Ecole Nationale Supérieure Agronomique de
MONTPELLIER

MONTPELLIER, le 12 Juin 1969

NOTE : 8

M I L D I O U

Les ~~averses~~ orageuses du 11 Juin ont intéressé les vignobles des départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude, en particulier.

Elles ont été relativement peu importantes et se sont abattues sur un vignoble ne présentant, dans la plupart des cas, que des manifestations de mildiou encore assez dispersées.

Au moment de la pluie, les taches n'étaient pas bien fleuries d'efflorescences; mais étant donné que la végétation est restée mouillée toute la journée et toute la nuit et que la température est maintenant très favorable à l'extension de la maladie, de nouvelles taches apparaîtront à partir du 18 Juin.

Pour prévenir les conséquences fâcheuses de pluies importantes qui se produiraient après cette date il y a lieu de renouveler l'exécution du dernier traitement.

Le Directeur de la Station Régionale
d'Avertissements Viticoles :

G. BERNON

Tirage du 12 Juin 1969

DELAIS D'EMPLOI DES PESTICIDES POUR LE TRAITEMENT SUR PIED
DES VEGETAUX DONT LA RECOLTE EST CONSOMMABLE

-:-:-:-:-

DLP 18-6-69 943270

Nom commun du produit	: Délais :	Observations
	: en jours :	
	:	
G - <u>Acaricides spécifiques</u> :	:	
- binapacryl	: 21 :	
- chinométhionate	: :	Non dangereux pour les abeilles.
- chlorbenside	: 7 :	
- chlorobenzilate	: 7 :	Non autorisé sur arbres à noyau.
- chlorofénizon	: 7 :	
- chloropropylage	: 7 :	
- chlorphénomidine,	: 15 :	Non dangereux pour les abeilles.
- C P A S + B C P E	: 30 :	
- dicofol	: 15 :	Non dangereux pour les abeilles.
- fénazaflor	: 21 :	
- fénizon	: 7 :	
- phenkapton	: 15 :	
- tétradifon	: 7 :	Non dangereux pour les abeilles.
- tétrasul	: 7 :	Non dangereux pour les abeilles.
- thioquinox	: 15 :	Non dangereux pour les abeilles.
- dioxathion + fénizon	: 15 :	
H - <u>Fongicides</u>	:	
- binapacryl	: 21 :	
- dichlofluanide	: 7 :	
- drazoxolon	: 15 :	
- tétrachloroisophtalo-	:	
nitrile	: 15 :	
I - <u>Divers</u>	:	
- métaldéhyde	: 7 :	Pour les traitement en pulvérisation et poudrage.

F I N

P372